

		1病日	2病日	21病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	<ul style="list-style-type: none"> 休薬完了21日目 外 125 胃癌 HERBS/XP 3回目以降 がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 カベシタピン処方 14日分 体表面積で変更 		
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ---①		
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ハロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 204ml/h 注入時間 30分 ---②		
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 トラスズマブ注 6mg/kg 注射用水PL「フソー」 20mL 1A 1日1回 注入時間 1時間30分 ★前回異常なければ60分に短縮可 ---③		
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン ラクチックG輸液 500mL 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 8mL 1日1回 ★アプレビタント内服確認★ ---④ 注入時間 1時間		
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン テルモ生食 500mL 1袋 シスプラチン注 80mg/m ² 1日1回 ★全量500mLに合わせる ---⑤ 注入時間 2時間		
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン ラクチックG輸液 500mL 1袋 1日1回 ---⑥ 注入時間 1時間		
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン ラクチックG輸液 1L 1袋 1日1回 ---⑦ 注入時間 2時間30分		
一般注射				
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 3日分 抗がん剤翌日より内服	
		アプレビタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1CP（3日間） 1日1回、125mgを使用 2日目を以降、80mgを午前中に服用 カベシタピン処方 体表面積で変更 外来処方：別		

副作用への対応

悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。

便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。

下痢 …… 便がゆるくなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。

口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。

好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。

脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。

発熱、悪寒(インフルエンザ/コロナ) …… 点滴中～投与後24時間以内に発熱する。(トラスズマブ)

心臓機能低下 …… 繰り返し点滴することにより労作時の呼吸困難、下肢浮腫、急激な体重増加などの症状が現れることがあるため、定期的に心エコー検査などを行う。(トラスズマブ)

腎機能障害 …… 予防のために点滴当日から3日間は1L/日の飲水を心がけてください。(シスプラチン)

アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによりアレルギー反応を起こすことがある。(シスプラチン)

手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上の塗布を行う。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(カベシタピン)