

		1病日	2病日	15病日	21病日
休薬完了	休薬完了				
文書作成	文書	休薬完了21日目 外 126 大腸癌 S0X/Bev がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 S-1:14日分 体表面積にて処方		S-1休薬	休薬完了
注射	抗がん剤	実施確認：未 ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間確認！ ---①			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ---②			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---③			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバンスマブ点滴静注用 7.5mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---④			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚糖液5%250mL 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 2時間 ---⑤			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 フラッシュ用 ---⑥			
		実施確認：未 ワンショット中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 OVポート、セブタム洗浄用 ---⑦			
	一般注射				
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠 ファモチジン錠20mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分 抗がん剤翌日より内服		
		S-1:14日分 体表面積参照にて処方		S-1休薬開始	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回うがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバンスマブ)
- タンパク尿 …… 定期的に尿検査を行う。(ペバンスマブ)
- 鼻血 …… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバンスマブ)
- 末梢神経障害 …… 冷感刺激を避けること(特に点滴後5日間程度)。治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。痛みを伴う場合は痛み止めを使うことがある。(オキサリプラチン)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(オキサリプラチン)
- 流涙 …… 防腐剤を含まない人工涙液を5~6回/日点眼する。(S-1)
- 手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上塗布。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(S-1)