

		1病日	2病日	21病日
休業完了	休業完了			休業完了
文書作成	文書	<ul style="list-style-type: none"> 休業完了21日目 外 137 胃癌 XP がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 		
		<ul style="list-style-type: none"> カペシタピン処方 14日分 体表面積で変更 		
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 点滴未梢 メイン ラクテックG輸液 1L 1袋 1日1回 点滴速度 400ml/h 注入時間 2時間30分 ①		
		実施確認：未・ 点滴未梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 204ml/h 注入時間 30分 ② ★アプレピタント内服確認★		
		実施確認：未・ 点滴未梢 メイン テルモ生食 500mL 1袋 シスプラチン注 60mg/m ² 1日1回 ★全量500mLに合わせる 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ③		
		実施確認：未・ 点滴未梢 メイン ラクテックG輸液 1L 1袋 1日1回 点滴速度 400ml/h 注入時間 2時間30分 ④		
	一般注射			
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 3日分 抗がん剤翌日より内服	
		アプレピタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1CP (3日間) 1日目、125mgを使用 2日目以降、80mgを午前中に服用		
		<ul style="list-style-type: none"> カペシタピン処方 体表面積で変更 外来処方：別 		

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が細くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上の塗布を行う。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(カペシタピン)
- 腎機能障害 …… 予防のために点滴当日から3日間は1L/日の飲水を心がけてください。(シスプラチン)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(シスプラチン)