

		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	<input checked="" type="checkbox"/> 休薬完了21日目 内 141 非小細胞ガン CBDCA+S-1	
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書	
		<input checked="" type="checkbox"/> ★S-1 (day1-14)体表面積にて処方 1.25㎡未満 80mg 1.25㎡以上 1.5㎡未満 100mg 1.5㎡以上 120mg	
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 持続末梢メイトソフ 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 1A 1日1回 点滴速度 212ml/h 注入時間 30分 ---① ★アプレピタント125mg服用確認	
		実施確認：未・ 持続末梢メイトソフ 大塚生食注 250mL 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC=5 1日1回 注入時間 1時間 ---②	
		実施確認：未・ 持続末梢メイトソフ 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	
	一般注射		
処方	処方	アプレピタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目以降、80mgを午前中に服用	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(カルボプラチン)
- 流涙 …… 防腐剤を含まない人工涙液を5～6回/日点眼する。(S-1)
- 手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上塗布。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(S-1)