

		1病日	8病日	15病日	28病日
休業完了	休業完了				休業完了
文書作成	文書	休業完了28日目 外 158 胃癌 Ram-nab-PIX がん薬物療法の前作用についての説明書・同意書			
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ★ハル輸液セット使用★ ★ゾノレドリン内服確認★ —①—	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 —①—	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ★ハル輸液セット使用★ ★ゾノレドリン内服確認★ —①—	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL 1袋 フアモテゾン注射液2.0mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 —②— ↓ ↓ ↓ ★ハル輸液セット使用★ ★ゾノレドリン内服確認★	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL 1袋 フアモテゾン注射液2.0mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 —②— ↓ ↓ ↓ ★ハル輸液セット使用★ ★ゾノレドリン内服確認★	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL 1袋 フアモテゾン注射液2.0mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 —②— ↓ ↓ ↓ ★ハル輸液セット使用★ ★ゾノレドリン内服確認★	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 ★フィルター使用禁止★ ★50mlの投与中は止めておく★ ★10分後でnab-n 剤投与に使用★ —③—	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 100mL nab-バクシケル点滴静注用 100mg/g/ml 1日1回 注入時間 30分 ★全量( )ml★ ★7A7 シ製剤 泡立ちやすいので注意★ —③— 1V 20mlで溶解・・・5mg/ml 生食空容器に充填すること	実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 ★フィルター使用禁止★ ★50mlの投与中は止めておく★ ★10分後でnab-n 剤投与に使用★ —③—	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 ラムシルマブ点滴静注液 8mg/kg 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 1時間 全量250mlに合わせる ★ハル輸液セット使用★ —④—	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 —④—	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 ラムシルマブ点滴静注液 8mg/kg 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 1時間 全量250mlに合わせる ★ハル輸液セット使用★ —④—	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ★ハル輸液セット使用★ ★終了後はメイン止め☆ ※投与後、1時間は観察を十分に… —⑤—	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ★ハル輸液セット使用★ ★終了後はメイン止め☆ ※投与後、1時間は観察を十分に… —⑤—	実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ★ハル輸液セット使用★ ★終了後はメイン止め☆ ※投与後、1時間は観察を十分に… —⑤—	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 100mL nab-バクシケル点滴静注用 100mg/g/ml 1日1回 注入時間 30分 ★7A7 使用禁止★ 全量( )ml★ ★7A7 シ製剤 泡立ちやすいので注意★ —⑥— ↓ ↓ ↓ 1V 20mlで溶解・・・5mg/ml 生食空容器に充填すること	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 —⑥—	実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 100mL nab-バクシケル点滴静注用 100mg/g/ml 1日1回 注入時間 30分 ★7A7 使用禁止★ 全量( )ml★ ★7A7 シ製剤 泡立ちやすいので注意★ —⑥— ↓ ↓ ↓ 1V 20mlで溶解・・・5mg/ml 生食空容器に充填すること	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ★nab-n 剤投与終了後フラッシュ☆ —⑦—	実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ★nab-n 剤投与終了後フラッシュ☆ —⑦—	実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ★nab-n 剤投与終了後フラッシュ☆ —⑦—	
一般注射					
処方	処方	ジフェンヒドรามミン錠 10mg 5錠 血管確保前に服用		ジフェンヒドรามミン錠 10mg 5錠 血管確保前に服用	ジフェンヒドรามミン錠

□副作用への対応  
 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。  
 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。  
 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。  
 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。  
 好中球減少 …… 感染症予防のために外出だけでなく自宅でもマスクも手洗いうがいを頻回に行う。  
 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。  
 高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ラムシルマブ)  
 タンパク尿 …… 定期的に尿検査を行う。(ラムシルマブ)  
 鼻血 …… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ラムシルマブ)  
 末梢神経障害 …… 指を繰り返すことによって手足がしびれることがある。(nab-バクシケル)  
 関節痛・筋肉痛 …… 点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることもある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うこともある。(nab-バクシケル)