

		1病日	2病日	14病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了14日目 外 162 乳癌 dose dense EC がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 ★ファシール輸液セット使用★ ヘクワルガスタムの投与指示確認		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ハロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 ファモチジン注射液20mg 2mL 1A d-エーケルフェニラミン注5mg 1mL 1A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ★プラネクタ 2個 使用 ★ ★★アプレピタント(125mg)服用確認★★ ★ファシール輸液セット使用★		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 ★①の点滴の側管より同時に全開で ★ルトは後でエビリン投与に使用★ ---②		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 注射用シクロホスファミド 600mg/m ² 1日1回 ★ファシール・スパイクセット使用★ 注入時間 1時間 ---③		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚糖液5% 100mL 1瓶 エビルピシン塩酸塩注射液 90mg/m ² 1日1回 ★シクロホスファミドの側管より同時に全開で ★投与側の腕を温める ---④		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 ★エビルピシン終了後全開で ★終了後もラインははずさない★ ---⑤		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 400ml/h 注入時間 15分 ★ファシール・スパイクセット使用★ ---⑥		
		一般注射		
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠 ファモチジンD錠20mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 4日分 抗がん剤点滴翌日より内服	
		アプレピタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目以降、80mgを午前中に服用		

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 出血性膀胱炎 …… 排尿時に痛みが出たり、残尿感等の症状があらわれることがある。(シクロホスファミド)