

		1日目	8日目	15日目	28日目
休薬完了 文書作成	休薬完了 文書 休薬完了28日目 がん化学・免疫療法副作用についての説明書・同意書 ※ 175 乳癌 Atazo+nabPTX				休薬完了
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ★バルブ液セット使用★ ①	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ①	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ★バルブ液セット使用★ ①	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg 1袋 フアモデジン注射液20mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.9mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 20ml/h 注入時間 30分 ★バルブ液セット使用★ ②	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg 1袋 フアモデジン注射液20mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.9mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 20ml/h 注入時間 30分 ②	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg 1袋 フアモデジン注射液20mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.9mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 20ml/h 注入時間 30分 ★バルブ液セット使用★ ②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 水フィルタ-使用禁止★ ★777'177'投与中は止めておく★ ★1は後でnab-パクリタキセル投与に使用★ ③	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 100mL nab-パクリタキセル点滴静注用100mg 100mg/ml 1日1回 注入時間 30分 ★全量()ml★ ★777'177'製剤 泡立ちやすいので注意★ ③ ↓ ↓ ↓ 1V 20mlで溶解・・・5mg/ml 生食空容器に充填すること	実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 水フィルタ-使用禁止★ ★777'177'投与中は止めておく★ ★1は後でnab-パクリタキセル投与に使用★ ③	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 アテゾリズマブ点滴静注840mg 14mL 840mg 1日1回 注入時間 1時間 ★バルブ液セット使用★ ★前回、異常なければ30分に短縮可 ④	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ④	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 アテゾリズマブ点滴静注840mg 14mL 840mg 1日1回 注入時間 1時間 ★バルブ液セット使用★ ★前回、異常なければ30分に短縮可 ④	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★バルブ液セット使用★ ★投与後、1時間は観察を十分に・・・ ⑤		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★バルブ液セット使用★ ★投与後、1時間は観察を十分に・・・ ⑤	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 100mL nab-パクリタキセル点滴静注用100mg 100 mg/ml 1日1回 注入時間 30分 ★水フィルタ-使用禁止★ 全量()ml★ ★777'177'製剤 泡立ちやすいので注意★ ⑥ ↓ ↓ ↓ 1V 20mlで溶解・・・5mg/ml 生食空容器に充填すること	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 100mL nab-パクリタキセル点滴静注用100mg 100 mg/ml 1日1回 注入時間 30分 ★全量()ml★ ★777'177'製剤 泡立ちやすいので注意★ ⑥ ↓ ↓ ↓ 1V 20mlで溶解・・・5mg/ml 生食空容器に充填すること	実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 100mL nab-パクリタキセル点滴静注用100mg 100 mg/ml 1日1回 注入時間 30分 ★水フィルタ-使用禁止★ 全量()ml★ ★777'177'製剤 泡立ちやすいので注意★ ⑥ ↓ ↓ ↓ 1V 20mlで溶解・・・5mg/ml 生食空容器に充填すること	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ★nab-パクリタキセル終了後フラッシュ★ ⑦		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ★nab-パクリタキセル終了後フラッシュ★ ⑦	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 高熱後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応
- 間質性肺疾患 …… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 大腸炎 …… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 1型糖尿病 …… 口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
- 神経障害 …… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
- 皮膚障害 …… 顔に発疹が出ることもあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
- 内分泌障害 …… 倦怠感が発現することがある。
- 末梢神経障害 …… 治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。(nab-パクリタキセル)
- 関節痛・筋肉痛 …… 点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることもある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うこともある。(nab-パクリタキセル)