

		1病日	8病日	21病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目 内 178 非小細胞肺癌 VNR/Bev がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 デキサメタゾン注射液 3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 204ml/h 注入時間 30分 ――① ↓ ↓ ↓ ★ブラネクタ 2個必要（1個は緊急対応用）	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 デキサメタゾン注射液 3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 204ml/h 注入時間 30分 ――① ↓ ↓ ↓ ★ブラネクタ 2個必要（1個は緊急対応用）	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 400ml/h 注入時間 15分 ★側管から ビノレルビンと同時に開始 ――②	実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 400ml/h 注入時間 15分 ★側管から ビノレルビンと同時に開始 ――②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 ビノレルビン注 25mg/m ² 1日1回 ★全開で10分以内に投与 ★投与側の腕を温める ――③	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 ビノレルビン注 25mg/m ² 1日1回 ★全開で10分以内に投与 ★投与側の腕を温める ――③	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ビノレルビンの後フラッシュ ――④	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ビノレルビンの後フラッシュ ――④	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 15mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ――⑤		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ――⑥		
	一般注射			

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …………… 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …………… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …………… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …………… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …………… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 高血圧 …………… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバシズマブ)
- タンパク尿 …………… 定期的に尿検査を行う。(ペバシズマブ)
- 鼻血 …………… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバシズマブ)