

		1病日	3病日	14病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了14日目		
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 外 178 肺臓癌 Na-IRI+5-FU/LV		
注射	抗がん剤	実施確認：未・ ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間確認 ---①		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ---② ルート確保用		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ハロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---③		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚糖液5% 500mL 1袋 na-イリノテカン点滴静注 70mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 1時間30分 ---④		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---⑤ na-イリノテカンフラッシュ用		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚糖液5%250mL 1袋 レボホリナート点滴静注用 200mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 2時間 ---⑥		
	実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 50mL フルオロウラシル注 2400mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 46時間 ---⑦ インフューザーポンプ ★薬剤の投与量別希釈表参照★			
	携帯ポンプ			
	一般注射	ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A		

□副作用への対応  
 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。  
 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。  
 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。  
 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。  
 好中球減少 …… 感染症予防のために外出だけでなく自宅で過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。  
 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。