

		1回目	2回目	3回目	14回目
休業完了	休業完了				休業完了
文書作成	文書	休業完了14日目			
		外 179 膀胱癌 modified FOLFIRINOX がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書			
注射	抗がん剤	実施確認：未 ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時開通確認！ ---①			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ルート確保用 ---②			
		実施確認：未 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---③ ルートは後でレボホリナート投与に使用 ★アプレピタント(125mg)服用確認			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚糖液5%250mL 1袋 オキサリプラチン注 85mg/m ² 1日1回 ---④ 注入時間 2時間			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 イリノテカン点滴静注 150mg/m ² 1日1回 注入時間 2時間 ★レボホリナートと同時に投与 ---⑤			
		実施確認：未 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注用 200mg/m ² 1日1回 注入時間 2時間 ★イリノテカンと同時に投与 ---⑥			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 50mL フルオロウラシル注 2400mg/m ² 1日1回 注入時間 46時間 ---⑦ インフューザーポンプ ★5-FU投与量別希釈表参照★			
	一般注射	携帯ポンプ			
			ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A		
処方	処方	アプレピタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1CP (3日間)	デカドロン錠4mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 3日分	⇒	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウイッグを利用する。
- 末梢神経障害 …… 冷感刺激を避けること(特に点滴後5日間程度)。治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。痛みを伴う場合は痛み止めを使うことがある。(オキサリプラチン)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(オキサリプラチン)