

		1病日	14病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	休薬完了14日目 外 184 大腸癌 BEACON (biweekly) がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 (day1-14)エンコラフェニブ内服 (day1-14)ピニメチニブ内服	
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 デキサメタゾン注射液 3.3mg 1mL 2A d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注 5mg 0.5% 1mL 1A 1日1回 点滴速度 206ml/h 注入時間 30分 ---①	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 セツキシマブ注射液 500mg/m ² 1日1回 注入時間 2時間 ---②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与後、1時間は観察を十分に… ---③	
	一般注射		
処方	処方	ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 2錠 1日2回 朝・夕食後 14日分	⇒
		ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 25g 2本 ぬり薬 1日2回 部位体 保湿剤として	
		ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム0.1% 5g 1本 ぬり薬 1日2回 部位：顔	
		ジフルブレドナート軟膏0.05% 5g 1本 ぬり薬 1日2回 部位：体・手足	
		ミノサイクリンは6週間服用	

□副作用への対応

- 皮膚乾燥 …………… 治療が進むにつれて乾燥と掻痒感が強くなる可能性があるため、開始と同時に保湿剤を使用して保湿を開始する。(セツキシマブ)
- にきび様さ瘡 …………… 顔や前胸部などに皮疹が出現するので、出現時には部位に応じたステロイド軟膏を保湿剤を塗布した上から塗布する。(セツキシマブ)
- 電解質異常 …………… 血液中のマグネシウム低下に伴って、動悸などが発現する可能性がある。(セツキシマブ)
- 高血圧 …………… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(エンコラフェニブ・ピニメチニブ)
- 眼障害 …………… 視力の低下や眼の充血などが現れることがある。(エンコラフェニブ・ピニメチニブ)
- 手掌・足底発赤知覚不全症候群 …………… 手や足のシビレや感覚異常、水ぶくれや赤く腫れることがある(エンコラフェニブ・ピニメチニブ)