

		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		
文書作成	文書	休薬完了21日目	
		内 243 非小細胞肺癌 CBDCA+PEM+Atezo	
		がん化学・免疫療法の副作用についての説明書・同意書	
注射	抗がん剤	実施確認：未 持続末梢インフュージョン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注 0.75mg 5mL 1瓶 デキサメサゾン注射液 3.3mg 1mL 1A 1日1回 点滴速度 212ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ↓ ↓ ★パル輸液セット使用★ ★アプレピタント(125mg)内服確認	
		実施確認：未 持続末梢インフュージョン 大塚生食注 250mL 1袋 アテゾリズマブ点滴静注 1200mg 1日1回 注入時間 1時間 ★パル輸液セット使用★ ★前回、異常なければ30分に短縮可 ---②	
		実施確認：未 持続末梢インフュージョン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ---③	
		実施確認：未 持続末梢インフュージョン 大塚生食注 100mL 1瓶 ベメトレキセド注射用 500mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 10分 ---④	
		実施確認：未 持続末梢インフュージョン 大塚生食注 250mL 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC=6 1日1回 注入時間 1時間 ---⑤	
		実施確認：未 持続末梢インフュージョン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---⑥	
		一般注射	ビタミンB12製剤/9W (im)
処方	処方	アプレピタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目以降、80mgを午前中に服用 葉酸製剤 連日内服	

□副作用への対応

悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。  
便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。  
下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。  
口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。  
好中球減少 …… 感染症予防のために外出だけでなく自宅でも手洗い・うがいを頻回に行う。  
脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。  
アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(カルボプラチン)

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

間質性肺疾患 …… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。  
大腸炎 …… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。  
1型糖尿病 …… 口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。  
神経障害 …… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。  
皮膚障害 …… 体に発疹が出ることもあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。  
内分泌障害 …… 倦怠感が発現することがある。