

		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	<p>休薬完了21日目</p> <p>内 244 非小細胞肺癌 PEM+Atezo がん化学・免疫療法の副作用についての説明書・同意書</p>	
注射	抗がん剤	<p>実施確認：未 持続末梢バイポーラ グラニセトロン点滴静注パック3mg／100mL 1袋 デキサメタゾン注射液 3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 204mL/h 注入時間 30分 ---① ★バルブ液セット使用★</p> <p>実施確認：未 持続末梢バイポーラ 大塚生食注 250mL 1袋 アテソリズマフ点滴静注 1200mg 1日1回 注入時間 1時間 ★バルブ液セット使用★ ★前回、異常なければ30分に短縮可 ---②</p> <p>実施確認：未 持続末梢バイポーラ 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200mL/h 注入時間 30分 ---③</p> <p>実施確認：未 持続末梢バイポーラ 大塚生食注 100mL 1瓶 ベメトレキセド注射用 500mg/m² 1日1回 注入時間 10分 ---④</p> <p>実施確認：未 持続末梢バイポーラ 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500mL/h 注入時間 6分 ---⑤</p> <p>一般注射 ビタミンB12製剤 9W (im)</p>	
処方	処方	葉酸製剤 連日内服	

□副作用への対応

悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しづつでも食べる。水分を摂るようにする。
 便秘 ……………… 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
 下痢 ……………… 便が緩くなることがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
 口内炎 ……………… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
 好中球減少 ……………… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
 脱毛 ……………… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウイッグを利用する。

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

間質性肺疾患 ……………… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
 大腸炎 ……………… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
 1型糖尿病 ……………… 口や喉が渴き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
 神経障害 ……………… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
 皮膚障害 ……………… 体に発疹が出ることがあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
 内分泌障害 ……………… 倦怠感が発現することがある。