

		1病日	2病日	21病日	
休業完了	休業完了			休業完了	
文書作成	文書	休業完了21日目			
		内 245 非小細胞肺癌 CDDP+PEM+Atezo (SH)			
		がん化学・免疫療法の副作用についての説明書・同意書			
注射	抗がん剤	実施確認：未 持続末梢メイボ TM 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ↓ ↓ ★バル輸液セット使用★ ★アプレビタント(125mg)服用確認			
		実施確認：未 持続末梢メイボ TM 大塚生食注 250mL 1袋 アテゾリズマブ点滴静注 1200mg 1日1回 注入時間 1時間 ★バル輸液セット使用★ ★前回、異常なければ30分に短縮可 ---②			
		実施確認：未 持続末梢メイボ TM 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ---③			
		実施確認：未 持続末梢メイボ TM 大塚生食注 100mL 1瓶 ベメトレキセド注射用 500mg/m ² 1日1回 注入時間 10分 ---④			
		実施確認：未 持続末梢メイボ TM ラクテックG輸液 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1meq/mL 8mL 1日1回 点滴速度 508ml/h 注入時間 1時間 ---⑤			
		実施確認：未 持続末梢メイボ TM D-マンニトール/D-ソルビトール注射液 300mL 1瓶 1日1回 点滴速度 300ml/h 注入時間 1時間 ---⑥			
		実施確認：未 持続末梢メイボ TM テルモ生食 500mL 1袋 シスプラチン注 75mg/m ² 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 1時間 ★全量500mlに合わせる ---⑦			
		実施確認：未 持続末梢メイボ TM ラクテックG輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 1時間 ---⑧			
		一般注射	ビタミンB12製剤/9W (im)		
			必要に応じて輸液追加		
処方	処方		デキサメタゾン錠 4mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分 抗がん剤翌日より内服		
		アプレビタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目を降、80mgを午前中に服用 葉酸製剤 連日内服			

□副作用への対応

悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
便秘 …… 便が出にくくなるがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
下痢 …… 便が緩くなるがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
口内炎 …… 予防のために食後の菌磨き、頻回のうがいをする。
好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
腎機能障害 …… 予防のために点滴当日から3日間は1L/日の飲水を心がけてください。(シスプラチン)
アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによりアレルギー反応を起こすことがある。(シスプラチン)

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

間質性肺疾患 …… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
大腸炎 …… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
1型糖尿病 …… 口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
神経障害 …… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
皮膚障害 …… 体に発疹が出ることもあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
内分泌障害 …… 倦怠感が発現することがある。