

		1病日	2病日	21病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目		
		外 31 乳癌 AC がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 ★ファシール輸液セット使用★		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 ファモチジン注射液 20mg 2mL 1A d-スクロルフェニラミン注5mg 1mL 1A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ★フラネクタ 2個 使用 ★ ★ファシール輸液セット使用★		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 5A 1日1回 ★①の点滴の側管より同時に全開で ★ルトは後でド'初ル'シ投与に使用★ ---②		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 注射用シクロホスファミド 600mg/m <sup>2</sup> 1日1回 ★ファシール・ス'イ'セット使用★ 注入時間 1時間 ---③		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 1瓶 ドキシソルピシン注用 60mg/m <sup>2</sup> 1日1回 ★シクロホスファミドの側管より同時に全開で ★投与側の腕を温める ---④		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 ★ドキシソルピシン終了後全開で ★終了後もラインははずさない★ ---⑤		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 400ml/h 注入時間 15分 ★ファシール・ス'イ'セット使用★ ---⑥		
	一般注射			
処方	処方		デキサメタゾン錠 4mg 2錠 ファモチジンD錠 20mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 4日分 抗がん剤点滴翌日より内服	
		アプレピタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目以降、80mgを午前中に服用		

口副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 ……………… 便が出にくくなるがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 ……………… 便が緩くなるがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 ……………… 予防のために食後の菌磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 ……………… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 ……………… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 出血性膀胱炎 ……………… 排尿時に痛みが出たり、残尿感等の症状があらわれることがある。(シクロホスファミド)