

休薬完了	休薬完了	1病日	2病日	21病日
文書作成	文書	<p>休薬完了21日目</p> <p>内 54 非ホジキンリンパ腫 R-THP-COP療法 ※リツキシマブ</p> <p>がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書</p> <p>リツキシマブ投与30分前: 抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤服用</p>	<p>★ファシール輸液セット使用★</p>	休薬完了
注射	抗がん剤	<p>実施確認: 未 持続末梢バイポーラ 大塚生食注 1.00mL 1瓶 ヒドロコルチゾン注 1.00mg 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ---① ☆内服前投薬あり☆</p>	<p>実施確認: 未 持続末梢バイポーラ グラニセトロン点滴静注3mg/100mL 1袋 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★ファシール輸液セット使用★ ★留置針はそのまままで輸液セット交換 ---①</p>	
		<p>実施確認: 未 持続末梢バイポーラ テルモ生食 5.00mL 1袋 リツキシマブ点滴静注 375mg/m² 1日1回 ★翌日 11時に終了★ ---②</p>	<p>実施確認: 未 持続末梢バイポーラ 大塚生食注 1.00mL 1瓶 ビンクリスチン注 1.4mg/m² 1日1回 注入時間 30分 ★ファシール・ハイカセット使用★ ★投与側の腕を温める ---②</p>	
		<p>実施確認: 未 持続末梢バイポーラ 大塚糖液5% 1.00mL 1瓶 ピラルビシン注 50mg/m² 1日1回 注入時間 30分 ★ファシール・ハイカセット使用★ ★投与側の腕を温める ---③</p>	<p>実施確認: 未 持続末梢バイポーラ テルモ生食 5.00mL 1袋 シクロホスファミド注 750mg/m² 1日1回 注入時間 2時間 ★ファシール・ハイカセット使用★ ---④</p>	
		<p>実施確認: 未 持続末梢バイポーラ 大塚生食注 5.00mL 1瓶 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ★ファシール・ハイカセット使用★ ---⑤</p>		
	一般注射			
処方	処方		フレドニゾロン錠 5mg 60mg/m ² 1日3回 朝・昼・夕食後 5日分	

□副作用への対応

- 恶心嘔吐、食欲不振 食事が摺りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
 便秘 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
 下痢 便が緩くなることがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
 口内炎 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
 好中球減少 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
 脱毛 点滴後、早い場合は2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やワッグを利用する。
 好中球、リンパ球減少 ヘルペスウイルス感染、帯状疱疹、ヘルモシスチス肺炎、サイトメガロウイルス感染などの日和見感染のリスクがあるため、予防薬が処方されることがある。
 心機能障害 投与後数週間~数ヶ月の間に、頭痛(ドキドキする)・息切れ・浮腫がでる等の症状があらわれることがある。(ピラルビシン)
 出血性膀胱炎 排尿時に痛みが出たり、残尿感等の症状があらわれることがある。(シクロホスファミド)
 不眠 ステロイド内服の影響で、睡眠がとりにくくなる可能性がある。(フレドニン)