

		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目	
		婦人 64 卵巣癌 NDP/PTX がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書	
		アルコール過敏症確認	
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ---① ↓ ↓ ↓ ↓ ★ハル輸液セット使用★ ★ジフェンヒドミン内服確認★	
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 5A ファモチジン注射液20mg 2mL 1A 1日1回 点滴速度 224ml/h 注入時間 30分 ---②	
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン テルモ生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 180mg/m ² 1日1回 ★ハル輸液セット使用★ 注入時間 3時間 ---③	
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 ネダプラチン静注用 75mg/m ² 1日1回 注入時間 1時間 ---④	
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 1L 1袋 点滴終了後除去 1日1回 点滴速度 400ml/h 注入時間 2時間30分 ---⑤	
	一般注射		
処方	処方	ジフェンヒドミン錠10mg 5錠 1日1回	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 末梢神経障害 …… 治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。(パクリタキセル)
- 関節痛・筋肉痛 …… 点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることもある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うこともある。(パクリタキセル)