

		1病日	2病日	15病日	16病日	28病日
休薬完了	休薬完了					休薬完了
文書作成	文書	休薬完了28日目		デカドロン処方		
		外 95 大腸癌 IRIS がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		S-1休薬		
注射	抗がん剤	S-1：14日分 体表面積より処方				
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ---①		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ---①		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---②		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---②		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚糖液5%250mL 1袋 イリノテカン点滴静注 100mg/m ² 1日1回 ---③ 注入時間 1時間30分		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚糖液5%250mL 1袋 イリノテカン点滴静注 100mg/m ² 1日1回 ---③ 注入時間 1時間30分		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---④ フラッシュ用		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---④ フラッシュ用		
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠 ファモチジン錠20mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分		デキサメタゾン錠4mg 2錠 ファモチジンD錠20mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分	
		S-1 80~120 mg/body day 1~14 day15~28休薬		S-1休薬開始		

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
口内炎 …… 予防のために食後の菌磨き、頻回のうがいをする。
好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウイッグを利用する。
流涙 …… 防腐剤を含まない人工涙液を5~6回/日点眼する。(S-1)
手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上塗布。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(S-1)