

		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 休薬完了21日目 泌尿器科 PC-2 前立腺癌 カバジタキセル がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 ☑ ★3~4W毎に繰り返し ★アルコール過敏症確認 	
注射	抗がん剤	実施確認：未 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A d-クロルフェニラミン注5mg 1mL 1A ファモチジン注射液20mg 2mL 1A 1日1回 点滴速度 214ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ↓ ↓ ★パル輸液セット使用	
		実施確認：未 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 カバジタキセル点滴静注 25mg/m ² 1日1回 注入時間 1時間 ★パル輸液セット使用 ★アルコール過敏症確認 ---②	
		実施確認：未 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	
	一般注射		
処方	処方	☑ プレドニゾン錠10mg/日 毎日投与	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。